

胃鏡檢查準備及藥物使用注意事項

1. 檢查前七天：

- A. 停用活絡血路之中西藥(魚油、銀杏、紅麴、人蔘、靈芝成分之保健品)
- B. 如您有服用抗血小板或抗凝血劑等藥物，需依建議時間停藥(詳請見下表)，避免當天可能需做切片或瘰肉切除，術後傷口出血及感染的危險性。如您未停藥，當日將無法進行切片或瘰肉切除。

2. 檢查前一天：

- A. 請於檢查前 12 小時完全禁食及禁水，直至檢查完成。

3. 檢查當日：

- A. 早上 5 點後禁止再喝任何水份及食品，且禁止服用降血糖劑及抗凝劑，如要服用其他慢性疾病藥物，可飲用少於 50cc 的白開水。
- B. 若因空腹過久造成低血糖症狀如冒冷汗，請先口含糖果並於檢查當日主動告知醫護人員。
- C. 檢查當日勿戴隱形眼鏡、勿化妝；尤其禁止塗抹指甲油及光療指甲，如無法卸除基於病人安全考量，麻醉醫師將不予無痛麻醉

● 服用抗血小板或抗凝血劑等以下藥物，需依建議時間停藥，請見下表：

藥名	檢查前停藥(天)	停藥天數計算方式
Ticlopidine(Licodine/Panaldine)	10	1. 健檢日(8/29)-停藥時間 7 天=需於 8/22 當天停藥
Aspirin(Tapal/Bokey)	7	
Clopidogrel (Plavix)		5
Prasugrel (Effient)	3	
Warfarin (Coumadin)		
Ticagrelor (Brilinta)		
Dipyridamole(Persantin /Sandel)	3	
Apixaban (Eliquis)	2	
Dabigatran (Pradaxa)		
Endoxaben (Lixian)		
Rivaroxaben (Xarelto)		
Cilostazol(Pletaal/Citazol)		



● 可能會影響凝血功能消炎止痛藥

藥名	檢查前停藥 (天)
Naproxen	4
Ibuprofen/Diclofenac/Ketoprofen/ketorolac	1

小叮嚀: 檢查當日若有進行切片或瘰肉切除，建議您一週內避免安排遠行或搭飛機